

CORONAVIRUS (COVID-19)

Quand passer un test diagnostique à la COVID-19 ?

En tout temps, une personne symptomatique peut consulter la ligne Info-COVID (1 877 644-4545) ou remplir l'[outil d'auto-évaluation](#) disponible www.quebec.ca afin de déterminer s'il est nécessaire d'obtenir un test diagnostique. À titre informatif, voici les symptômes à surveiller :

1. Enfants de **5 ans et moins**:

POUR LES ENFANTS DE MOINS DE 6 MOIS	POUR LES 6 MOIS A 5 ANS
<p>Si l'enfant présente un des symptômes identifiés à la case de droite de ce tableau, veuillez appeler la ligne Info-Santé (811) et suivre les recommandations données.</p>	<p>Un des symptômes ou regroupements de symptômes suivants depuis plus de 24 heures¹ :</p> <ul style="list-style-type: none">• Fièvre $\geq 38,5^{\circ}\text{C}$ (rectale)• Symptômes respiratoires : toux (nouvelle ou aggravée), essoufflement, difficulté à respirer• Mal de gorge ET fièvre modérée $\geq 38,1^{\circ}\text{C}$ (rectale)• Douleurs abdominales, vomissements ou diarrhée ET fièvre modérée $\geq 38,1^{\circ}\text{C}$ (rectale) <p>1. Pendant les premières 24 heures l'enfant doit être isolé et observé sans subir de test. S'il présente toujours les symptômes précédents après 24 heures, il est indiqué de passer un test.</p>

2. Personne de **6 ans et plus**:

UN symptôme parmi les suivants :	OU DEUX symptômes parmi les suivants ² :
<ul style="list-style-type: none">• Fièvre $\geq 38,1^{\circ}\text{C}$ (T° buccale)• Perte d'odorat soudaine, altération ou perte de goût (sans congestion nasale)• Toux (nouvelle ou aggravée)• Essoufflement• Difficulté à respirer• Mal de gorge	<ul style="list-style-type: none">• Mal de tête• Fatigue intense• Douleurs musculaires généralisées (non liées à un effort physique)• Perte d'appétit importante• Nausées ou vomissements• Douleur abdominale (mal de ventre)• Diarrhée <p>2. Si la personne présente UN SEUL des symptômes ci-haut, observer les symptômes et réévaluer régulièrement jusqu'à disparition : (outil d'autoévaluation des symptômes de la COVID-19).</p>

ATTENTION! Si un test diagnostique requis est refusé ou ne peut être obtenu, il sera alors nécessaire d'isoler la personne **pour une période d'au moins 10 jours** du début des symptômes **et** jusqu'à amélioration des symptômes. Les autres membres du domicile devront surveiller leurs symptômes et s'isoler **pendant 10 jours**.